

# 心配ですね!!

## シロアリが、ハネアリになって飛び出すシーズンとなりました。

★ハネアリが、おうちのまわりで飛んでいたりと、ハネが落ちていたりすると、「シロアリが家についたのかしら?」ととっても心配になりますよね。でも、実際に お宅に伺って 調べてみると、ただのアリだったりします。

★当社のユーザーの方でしたら、当社のほうで無料で点検させていただくことは可能ですが、つい何も知らずに 飛び込みの業者に頼んだりしてしまうと、悪徳業者はいっぱいいますから???・・・不必要な防蟻工事に とんでもない高額のお金を要求されたりします。

★シロアリが、どんな虫かを ある程度知って、シロアリがついているかどうかを 自己診断できることが、大切ではないでしょうか?

### ●シロアリの飛ぶ時期はいつでしょう?

シロアリは、ある時期、羽アリが巣から飛び出し、対(ペア)になって新しい巣を作ります。多数の羽アリが同時に飛び出すことから、これを群飛(ぐんぴ/スウォーム)と言います。群飛の時期と条件は、シロアリの種類によって違いますが、ヤマトシロアリの群飛は4月～5月、イエシロアリは6月～7月です。

シロアリは、目が退化している上、光を嫌って、その一生をほとんど地中の暗間で過ごします。しかし、不思議なことに、羽アリは光を恐れないで飛び出します。群飛の時間はわずか数十分、距離も数百メートルから1キロメートルが限界です。そして地上に降りると、不要になったハネを落とします。

### ●イエシロアリ

- ・群飛の時期・・・6～7月の温暖多湿な(むし暑い)夕方から夜
- ・体長 7.4～9.4mm
- ・体色 黄褐色
- ・虫に触れると、頭部先端から乳白色の液(防御物質)を出します。
- ・湿潤な木材だけでなく、水を運ぶ能力があるため被害は建物全体に及ぶ。
- ・古材より新材を好んで加害する
- ・光に向かって飛んでいく性質ありヤマトシロアリ・イエシロアリ・アメリカカンザイシロアリの分布図



### ●ヤマトシロアリ

- ・群飛の時期・・・4～5月の温暖多湿な(むし暑い)昼間
- ・体長 4.5～7.5mm
- ・体色 黒褐色
- ・虫に触れると、乳白色の液は出しません。
- ・水を運ぶ能力がないので、常に湿った木材中に生息する。主に水気のある建物の下部材を加害する。

### ●シロアリとアリはどうやって見分けるの?

アリ



- ・くびれ腰
- ・くの字型の触角
- ・前のハネ・・・大。後のハネ・・・小

シロアリ




- ・ずん胴
- ・じゅず状の触角
- ・前のハネと後のハネの大きさが同じ

## ●シロアリは、どんなところが好きなの？

湿気が多く、風通しの悪い場所は、シロアリ発生の要注意ポイントです。

- (1) 水をよく使う(台所、洗面所、トイレ、浴室)の床下。
- (2) 水をまくことの多い玄関まわり。



## ●こんな症状はありませんか？

レベル(1):シロアリが原因ではないかもしれませんが・・・。

- 扉すまやドアが、スムーズに開け閉めできない。

レベル(2):そのアリは本当にシロアリですか？

- 羽アリを見た。→もしシロアリなら、家の中で見かけた羽アリの数は、被害の程度に比例します

レベル(3):シロアリが巣食う要因が大きいですね・・・。

- 浴室のタイルにヒビが入っている。
- 外壁、内壁にヒビが入っている。
- 浴室の窓枠、敷居が、水腐れしている。

レベル(4):シロアリが原因の可能性が大です・・・。

- 床がブカブカする。
- 床下の布基礎内部表面などに、地盤面から、土で固めたような道(蟻道)がある。
- 木材の割れ目、すき間に土が詰まっている。→シロアリは、風や光を避けるため、木材の割れ目、すき間などに土を詰めます。
- 木材をたたくと、ポコポコと空洞音がする。

## ●さあ、あなたのおうちは大丈夫ですか？ もし、シロアリなら あなたはどうしますか？

もし、シロアリなら、大切なおうちを長く使うためにも「シロアリはお家の大敵」です。早めに、防蟻処理をされることをおすすめします。

また、シロアリ防除剤にも、薬が効く期限があります。現在の薬だと、その効果は一般的に約5年と考えてよいでしょう。

「一度消毒したから大丈夫」という油断は大敵です。ご心配なら、一度チェックしてみてもはいかがでしょうか？